

กระโดน

(Tummy-wood)



ชื่อเรียก
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ
ลักษณะทั่วไป

กระโดน

Careya sphaerica Roxb.

Tummy-wood, Patana oak

ไม้ต้นขนาดกลางสูง 6-10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ โดยมากลำต้นมักเตี้ย กิ่งก้านสาขามาก เปลือกหนาแตกลอนเป็นแผ่นๆ ปกติเปลือกสีเทา แต่มีไฟป่าเผาทุกปีจึงออกสีดำคล้ำ ใบเดี่ยวออกเรียงเวียนกันตามปลายกิ่ง รูปไข่กลับ กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบบางและเหนียว ขอบใบหยักเล็กน้อย เส้นแขนงใบข้างละ 9-15 เส้น ก้านใบยาว 0.3-2.5 เซนติเมตร ใบแก่ก่อนร่วงสีแสด ดอกสีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเดี่ยวๆ หรือเป็นกระจุกๆ ละ 2-3 ดอก กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ สีขาว หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้จำนวนมาก รังไข่ 4 ช่อง สีแดงปลายขาว เรียงเป็นชั้นๆ โคนเชื่อมติดกัน มีดอกพร้อมใบอ่อน ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 เซนติเมตร ฝัก/ผล ผลสดแบบมีเนื้อหลายเมล็ด ทรงกลม อวบน้ำ ขนาด 5-7 เซนติเมตร ที่ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ เมล็ด เมล็ดจำนวนมาก มีเยื่อหุ้ม แบน สีน้ำตาลอ่อน รูปขอบขนานผิวเรียบ

การขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด

